TEMA 4:

ASPECTOS GENÉTICOS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN DSD

Índice

1. Introducción a la genética de los DSD
2. Mecanismos genéticos involucrados en la diferenciación sexual
3. Alteraciones genéticas más frecuentes en los distintos tipos de DSD
4. Pruebas genéticas disponibles y su indicación en el estudio de los DSD
5. Estudio de cariotipo y técnicas citogenéticas avanzadas
6. Paneles de genes y secuenciación masiva (NGS)
7. Genética y asesoramiento familiar en DSD
8. Correlación genotipo-fenotipo: utilidad y limitaciones

1. INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA DE LOS DSD

Los **trastornos del desarrollo sexual (DSD)** son un grupo heterogéneo de condiciones en las que el **desarrollo gonadal, genital o de los caracteres sexuales secundarios** se ve alterado por una disrupción en los procesos biológicos que determinan el **sexo cromosómico, gonadal o fenotípico**. En su inmensa mayoría, los DSD tienen un **componente genético subyacente**, lo que convierte al estudio genético en un pilar central del proceso diagnóstico.

A diferencia de otras malformaciones congénitas, en los DSD las alteraciones genéticas pueden afectar desde **elementos cromosómicos macroscopables** (como monosomías, trisomías o reordenamientos estructurales), hasta **mutaciones monogénicas** en genes implicados directamente en la cascada de diferenciación sexual y gonadal. La **compleja interacción entre el genotipo y el ambiente hormonal intrauterino** también implica que, en muchos casos, no hay una correlación lineal entre una mutación genética y el fenotipo clínico.

Clasificación genética general de los DSD

Desde el punto de vista **genético**, los DSD pueden clasificarse según el nivel de alteración:

- **Alteraciones cromosómicas:** Implican anomalías numéricas o estructurales de los cromosomas sexuales (45,X; 47,XXY; 46,XX/46,XY quimera). Estas alteraciones suelen detectarse con **cariotipo estándar** y explican cerca del **15-20% de los DSD**.
- **Alteraciones génicas monogénicas:** Mutaciones en genes clave de la determinación sexual (SRY, SOX9, NR5A1, DHH, etc.) o de la **biosíntesis o acción hormonal** (CYP21A2, CYP17A1, AR). Estas alteraciones requieren **secuenciación genética** y explican aproximadamente **un 40-50% de los DSD**.
- **Alteraciones epigenéticas:** Si bien menos conocidas, se ha descrito que ciertas **alteraciones en la regulación epigenética de genes clave** pueden interferir en la determinación y diferenciación sexual sin alteraciones estructurales evidentes.

Justificación del estudio genético

El estudio genético en un paciente con DSD no solo es una herramienta diagnóstica, sino que también permite:

- Confirmar la **etiología molecular**, lo que facilita la **toma de decisiones terapéuticas** (especialmente en casos que requieren gonadectomía por riesgo tumoral).
- Definir el **riesgo de recurrencia familiar**, esencial en familias con consanguinidad o historial previo de DSD.
- Contribuir a la **asignación de sexo** y al asesoramiento sobre **desarrollo puberal y fertilidad**.
- Detectar **alteraciones sindrómicas asociadas**, mejorando el seguimiento global.

2. MECANISMOS GENÉTICOS INVOLUCRADOS EN LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL

El proceso de **determinación y diferenciación sexual** es el resultado de una secuencia precisa de eventos genéticos y hormonales que guían el desarrollo gonadal y genital. Su base genética incluye **genes maestros**, factores reguladores y vías de señalización específicas que interactúan desde las etapas más tempranas del desarrollo embrionario.

2.1. Determinación del sexo gonadal: el eje SRY-SOX9

La **determinación gonadal primaria** ocurre en la **semana 6** del desarrollo, cuando la gónada bipotencial del mesodermo intermedio inicia un proceso de **diferenciación hacia testículo o hacia ovario**, según la **presencia o ausencia** de ciertos factores genéticos.

En el varón 46,XY

- El gen **SRY** (localizado en el brazo corto del cromosoma Y) es el **factor determinante testicular primario**.

- **SRY** activa la expresión de **SOX9**, gen maestro en la formación de los cordones testiculares y diferenciación de células de Sertoli.
- **SOX9** induce la expresión de **AMH**, responsable de la **regresión de los conductos de Müller**.
- Otros genes como **NR5A1** (que codifica SF1), **DHH** (Desert Hedgehog) y **WT1** contribuyen a la **formación de testículos funcionales**.

En la mujer 46,XX

- En ausencia de SRY, la gónada bipotencial sigue el **programa ovárico**, dependiente de genes como:
 - **WNT4** y **RSPO1**, que promueven la diferenciación ovárica.
 - **FOXL2**, esencial para la **mantención del linaje ovárico** y para inhibir la transdiferenciación testicular.
- La ausencia de AMH permite el desarrollo de los **conductos de Müller** (útero, trompas y parte superior de la vagina).

2.2. Diferenciación sexual secundaria: acción hormonal

Una vez establecida la gónada (testículo u ovario), las **hormonas sexuales fetales** determinan el desarrollo de los genitales internos y externos.

- **Testosterona**: Secretada por las células de Leydig fetales. Es crucial para el desarrollo de los **conductos de Wolff** (epidídimo, deferentes, vesículas seminales).
- **DHT (dihidrotestosterona)**: Derivada de la conversión periférica de testosterona por la **5 α -reductasa tipo 2**, es esencial para la **virilización de los genitales externos**.
- **AMH**: Producida por las células de Sertoli; causa la regresión de los **conductos de Müller**.

2.3. Mecanismos de alteración genética

Las mutaciones que afectan cualquiera de estos genes pueden causar DSD a distintos niveles:

- **Defectos en SRY**: Disgenesia gonadal 46,XY.
- **Duplicación de SOX9**: Testiculación en 46,XX.
- **Mutaciones en AR (receptor de andrógenos)**: Insensibilidad androgénica.
- **Mutaciones en CYP21A2**: Hiperplasia suprarrenal congénita.
- **Microdeleciones WT1**: Disgenesia gonadal con nefropatía (síndrome de Denys-Drash).

2.4. Mosaicos y quimeras genéticas

Además de las mutaciones lineales, los DSD pueden originarse por **mosaicismo (45,X/46,XY)** o por **quimerismo verdadero (46,XX/46,XY)**, en los que dos líneas celulares de distinto origen cromosómico conviven en un mismo individuo. Estos casos son de particular interés quirúrgico, ya que la **presencia de tejido gonadal mixto** (ovotestis) es frecuente.

3. ALTERACIONES GENÉTICAS MÁS FRECUENTES EN LOS DISTINTOS TIPOS DE DSD

El conocimiento de las **bases moleculares** de los DSD ha avanzado de forma significativa en las últimas dos décadas, gracias a la **secuenciación genética masiva (NGS)** y al estudio funcional de las vías de **determinación y diferenciación sexual**. Actualmente, conocemos más de **60 genes** cuya alteración puede originar un DSD, y cada año se descubren nuevos mecanismos genéticos implicados.

Dada la **complejidad etiológica** de estos trastornos, es útil agrupar las alteraciones genéticas en **categorías diagnósticas** según el momento y el mecanismo afectado. A continuación, se detallan las **alteraciones genéticas más relevantes** según la clasificación clínica de los DSD.

3.1. Alteraciones genéticas en DSD con anomalías cromosómicas sexuales

Síndrome de Turner (45,X y mosaicos)

- **Gen implicado:** No se identifica un único gen causal. La monosomía parcial o completa del cromosoma X afecta genes de la región **PAR1** y genes implicados en el mantenimiento gonadal (SHOX, ZFX, DDX3X).
- **Fenotipo:** Disgenesia gonadal, talla baja, linfedema, malformaciones renales y cardiovasculares.
- **Riesgo quirúrgico:** Hipoplasia gonadal con alto riesgo de gonadoblastoma en mosaicos 45,X/46,XY.

Síndrome de Klinefelter (47,XXY)

- **Gen implicado:** Sobrecarga génica por el cromosoma X extra; algunos estudios implican disfunción de **NR5A1** por interacción alterada.
- **Fenotipo:** Hipogonadismo hipergonadotrópico, testículos pequeños, ginecomastia, infertilidad.
- **Riesgo quirúrgico:** Mayor riesgo de tumores germinales testiculares.

Quimerismo 46,XX/46,XY

- **Gen implicado:** Fusión de dos cigotos de distinto sexo.
- **Fenotipo:** Ovotesticular DSD con gónadas mixtas (ovotestis), genitales ambiguos o discordantes.
- **Riesgo quirúrgico:** Requiere evaluación gonadal bilateral, biopsia y manejo individualizado.

3.2. Alteraciones genéticas en DSD 46,XY

Disgenesia gonadal completa o parcial

- **Genes implicados:**
 - **SRY:** mutaciones o deleciones.
 - **SOX9:** haploinsuficiencia o defectos en regulación.
 - **NR5A1 (SF1):** mutaciones heterocigotas.
 - **WT1:** mutaciones asociadas al síndrome de Denys-Drash o Frasier.
 - **DHH:** mutaciones ligadas a disgenesia gonadal y neuropatía.
- **Fenotipo:** Gonadoblastoma en disgenesia gonadal con cromosoma Y.
- **Riesgo quirúrgico:** Gonadectomía preventiva ante disgenesia gonadal con Y residual.

Defectos en la biosíntesis de andrógenos

- **Genes implicados:**
 - **STAR:** déficit de transporte de colesterol.
 - **CYP11A1:** déficit de colesterol desmolasa.
 - **HSD3B2:** déficit de 3β-HSD.
 - **CYP17A1:** déficit de 17α-hidroxilasa/17,20 liasa.
 - **SRD5A2:** déficit de 5α-reductasa tipo 2.
- **Fenotipo:** Grado variable de virilización insuficiente y genitales ambiguos.
- **Riesgo quirúrgico:** Reconstrucción de seno urogenital, reconstrucción escrotal o vaginoplastia según el caso.

Defectos en la acción androgénica (Insensibilidad a andrógenos)

- **Gen implicado:** AR (receptor de andrógenos).
- **Fenotipo:**
 - **CAIS (insensibilidad completa):** fenotipo femenino completo con gónadas testiculares.
 - **PAIS (insensibilidad parcial):** genitales ambiguos o hipospadias severas.
- **Riesgo quirúrgico:** En CAIS, gonadectomía postpuberal; en PAIS, reconstrucción genital compleja.

Persistencia de conductos de Müller (PMDS)

- **Genes implicados:**
 - **AMH:** mutaciones inactivantes.
 - **AMHR2:** mutaciones en el receptor de AMH.
- **Fenotipo:** Presencia de útero y trompas en un neonato 46,XY con testículos.
- **Riesgo quirúrgico:** Manejo de estructuras müllerianas persistentes durante la orquidopexia.

3.3. Alteraciones genéticas en DSD 46,XX

Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)

- **Gen implicado:** **CYP21A2** (déficit de 21-hidroxilasa, 95% de casos).
- **Fenotipo:** Virilización de genitales externos en RN 46,XX.
- **Riesgo quirúrgico:** Cirugía de reconstrucción genital, sobre todo en formas Prader III-V.

DSD testicular 46,XX

- **Genes implicados:**
 - **SRY:** translocado al cromosoma X o autosomas.
 - **SOX9:** duplicación o activación ectópica.
 - **RSPO1:** mutaciones activadoras.
- **Fenotipo:** Genitales masculinos o ambiguos, infertilidad.
- **Riesgo quirúrgico:** Orquidopexia o gonadectomía según fenotipo.

3.4. Alteraciones genéticas sindrómicas

- **WT1** (Denys-Drash, Frasier): Disgenesia gonadal + nefropatía + riesgo tumoral.
- **WNT4:** Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser con virilización parcial.
- **SOX9:** Displasia campomélica con disgenesia gonadal.

Cuadro resumen: Genes y DSD asociados

Gen	Tipo de DSD	Fenotipo típico
SRY	Disgenesia gonadal 46,XY, DSD testicular 46,XX	Ambiguo o masculino
SOX9	Disgenesia gonadal, campomélica	Ambiguo, displasia ósea

NR5A1	Disgenesia gonadal, insuficiencia adrenal parcial	Ambiguo
WT1	Disgenesia gonadal + nefropatía	Ambiguo, tumores renales
CYP21A2	Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC)	Virilización femenina
AR	Insensibilidad androgénica	Femenino (CAIS) o ambiguo (PAIS)
SRD5A2	Déficit 5 α -reductasa	Ambiguo, hipospadias
AMH/AMHR2	Persistencia de conductos de Müller (PMDS)	Testículos + útero
STAR	Hiperplasia lipoidea congénita	Insuficiencia adrenal y gonadal
CYP11A1	Déficit de colesterol desmolasa	Ambiguo, crisis suprarrenal
HSD3B2	Déficit de 3 β -HSD	Ambiguo, insuficiencia suprarrenal
CYP17A1	Déficit de 17 α -hidroxilasa/17,20 liasa	Ambiguo, hipertensión
RSPO1	DSD testicular 46,XX	Masculino con cariotipo 46,XX
DHH	Disgenesia gonadal parcial	Ambiguo
WNT4	Hipoplasia mülleriana + virilización	Ambiguo, útero hipoplásico
FOXL2	Disgenesia gonadal 46,XX	Ambiguo, insuficiencia ovárica
GATA4	Disgenesia gonadal + malformación cardíaca	Ambiguo

4. PRUEBAS GENÉTICAS DISPONIBLES Y SU INDICACIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS DSD

La **evaluación genética** es una de las piezas clave en el diagnóstico integral de los **DSD**, permitiendo confirmar el origen molecular y orientar tanto el manejo médico como quirúrgico, además del **asesoramiento familiar**. Existen varias **pruebas genéticas** que pueden aplicarse de forma **escalonada**, dependiendo de la sospecha clínica, el fenotipo, el cariotipo y los resultados hormonales.

4.1. Pruebas básicas iniciales

- **Cariotipo convencional (bandeo G)**: Detecta anomalías numéricas y estructurales de los cromosomas sexuales (45,X; 47,XXY; translocaciones SRY).
- **FISH (Hibridación in situ fluorescente)**: Permite identificación rápida de la **presencia del gen SRY** y evaluación de mosaicismos con alta resolución (45,X/46,XY).
- **MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)**: Detecta **deleciones o duplicaciones submicroscópicas** en genes clave (SRY, SOX9, NR5A1).

4.2. Pruebas de mayor complejidad

- **Array-CGH (hibridación genómica comparada):** Útil en DSD **sindrómicos**, identifica **microdeleciones o microduplicaciones** que pueden no ser visibles en cariotipo.
- **Paneles génicos dirigidos:** Agrupan genes relacionados con DSD (paneles de 30-60 genes). Son especialmente útiles en **46,XY DSD** sin anomalías cromosómicas.
- **Secuenciación masiva (NGS):** En pacientes sin diagnóstico claro tras estudios iniciales, permite analizar cientos de genes implicados en **determinación sexual, esteroidogénesis y acción hormonal** en un solo análisis.

4.3. Indicaciones específicas según fenotipo

- **Genitales ambiguos con cariotipo 46,XX y virilización:** Estudio de **CYP21A2** (hiperplasia suprarrenal congénita).
- **46,XY con disgenesia gonadal:** Panel de **genes de determinación gonadal** (SRY, SOX9, WT1, NR5A1, DHH).
- **Insensibilidad androgénica:** Estudio específico de **AR**.
- **Persistencia de conductos müllerianos:** Análisis de **AMH y AMHR2**.

5. ESTUDIO DE CARIOTIPO Y TÉCNICAS CITOGENÉTICAS AVANZADAS

5.1. Cariotipo convencional

- Es el primer estudio genético ante cualquier sospecha de DSD.
- Detecta anomalías **numéricas** (Turner, Klinefelter) y **reordenamientos estructurales** (translocación de SRY a un cromosoma autosómico o X).
- Resolución: aproximadamente 5-10 Mb (megabases).

Ventajas

- Accesible, económico y ampliamente disponible.
- Fundamental para la **clasificación inicial** (46,XX, 46,XY, mosaicos).

Limitaciones

- No detecta **microdeleciones o mutaciones puntuales**.
- Puede pasar por alto mosaicismos de baja frecuencia.

5.2. FISH (Hibridación in situ fluorescente)

- Detecta la **presencia o ausencia de regiones específicas**, como la región SRY en el cromosoma Y.
- Útil en sospecha de **mosaicismo 45,X/46,XY** o translocación de **SRY**.

5.3. Array-CGH

- Permite detectar **microdeleciones o microduplicaciones** a nivel submicroscópico.
- Especialmente útil en DSD asociados a malformaciones sindrómicas o dismorfismos.
- Sensible a alteraciones menores no detectables en cariotipo.

6. PANELES DE GENES Y SECUENCIACIÓN MASIVA (NGS)

La incorporación de la **secuenciación masiva** ha revolucionado el diagnóstico molecular de los DSD, permitiendo un abordaje **multigénico**, especialmente útil en casos **46,XY DSD** sin causa evidente.

6.1. Paneles génicos específicos para DSD

- Permiten analizar simultáneamente genes clave de:
 - **Determinación gonadal** (SRY, SOX9, NR5A1, WT1, DHH, GATA4).
 - **Esteroidogénesis** (STAR, CYP11A1, HSD3B2, CYP17A1, CYP21A2).
 - **Acción hormonal** (AR, SRD5A2, AMH, AMHR2).
- Tiempo de respuesta: 4-8 semanas según el laboratorio.

Ventajas

- **Alta eficiencia diagnóstica** en DSD monogénicos.
- Orienta el **asesoramiento genético familiar**.

6.2. Exoma clínico y secuenciación completa (WES/WGS)

- Indicados en:
 - Casos con **fenotipo complejo o sindrómico**.
 - DSD sin causa tras paneles y estudios hormonales completos.
- Permite descubrir nuevas mutaciones en genes no previamente implicados en DSD.

Limitaciones

- Mayor complejidad interpretativa.
- Requiere equipo especializado en **bioinformática clínica**.
- Puede identificar **hallazgos incidentales** no relacionados.

El uso escalonado de estas técnicas (cariotipo → array-CGH → panel génico → WES/WGS) permite un **diagnóstico personalizado**, adaptado al fenotipo específico, y maximiza las posibilidades de obtener un diagnóstico molecular en cada paciente con DSD.

7. GENÉTICA Y ASESORAMIENTO FAMILIAR EN DSD

El diagnóstico genético de un DSD no solo tiene **implicaciones clínicas** para el paciente, sino que también afecta a la familia en términos de comprensión de la enfermedad, **riesgo de recurrencia** en futuros embarazos y manejo de **la incertidumbre sobre el desarrollo futuro del niño o niña**. El **asesoramiento genético** es una parte integral del manejo de los DSD y debe ofrecerse desde el momento inicial, con especial énfasis tras la confirmación diagnóstica.

7.1. Objetivos del asesoramiento genético

- **Explicar la causa genética subyacente**, cuando es conocida.
- **Describir el patrón de herencia** y el **riesgo de recurrencia**.
- **Informar sobre la variabilidad fenotípica**, especialmente en condiciones con expresión incompleta.
- **Favorecer la toma de decisiones informada**, sobre intervenciones médicas y quirúrgicas.
- **Promover un afrontamiento adaptativo**, evitando sentimientos de culpa o estigmatización.

7.2. Asesoramiento en DSD ligados al cromosoma X

En condiciones como la **insensibilidad androgénica completa o parcial (CAIS/PAIS)**, ligadas a mutaciones en **AR**, el asesoramiento debe abordar:

- **Herencia recesiva ligada al X**.
- Riesgo de **transmisión materna**.
- Posible estudio de **portadoras** en familiares femeninas (hermanas, tías).

7.3. DSD de novo y riesgo de recurrencia bajo

En DSD debidos a mutaciones **de novo**, como muchas disgenesias gonadales 46,XY por mutaciones en **SOX9** o **NR5A1**, el riesgo de recurrencia es generalmente **bajo**, aunque puede incrementarse si se detecta **mosaicismo germinal** en uno de los progenitores.

7.4. Asesoramiento en mosaicismos y quimerismo

En situaciones como el **quimerismo 46,XX/46,XY** o el **mosaicismo 45,X/46,XY**, el asesoramiento debe ser especialmente cuidadoso para explicar la **complejidad en la predicción fenotípica** y las **dudas sobre fertilidad futura**, además de la **necesidad de vigilancia tumoral**.

8. CORRELACIÓN GENOTIPO-FENOTIPO: UTILIDAD Y LIMITACIONES

La correlación entre el genotipo (alteración genética detectada) y el fenotipo (manifestaciones clínicas y anatómicas) es uno de los principales retos en el estudio de los DSD. Aunque en muchos casos existe una relación relativamente directa entre la mutación y el cuadro clínico, en otros casos la expresión fenotípica es **altamente variable**, incluso entre individuos con la misma mutación dentro de una misma familia.

8.1. Ejemplos de correlación clara

Gen	Mutación	Fenotipo típico
CYP21A2	Déficit severo	HSC clásica con virilización 46,XX
AR	Mutaciones nulas	Insensibilidad androgénica completa (CAIS)
SRD5A2	Mutaciones severas	Genitales ambiguos con virilización tardía en pubertad

En estos casos, la **mutación detectada** suele correlacionar de forma consistente con la **gravedad de la alteración genital y gonadal**, facilitando el asesoramiento y la planificación terapéutica.

8.2. Ejemplos de correlación variable

Gen	Mutación	Variabilidad fenotípica
NR5A1	Mutaciones heterocigotas	Desde criptorquidia aislada hasta disgenesia gonadal completa

Gen	Mutación	Variabilidad fenotípica
SOX9	Duplicaciones parciales	Desde hipospadias hasta testiculación completa en 46,XX
AR	Mutaciones moderadas	Desde hipospadias proximal hasta virilización completa

Esta **variabilidad intra e interfamiliar** complica el pronóstico y obliga a adoptar un **seguimiento individualizado**, adaptado a la evolución clínica y endocrinológica de cada paciente.

8.3. Factores moduladores

Factores genéticos adicionales

- **Modificadores génicos:** Variantes en genes relacionados pueden modular la expresión fenotípica (p.ej., variantes en **NR5A1** modulando disgenesias gonadales por mutaciones en **WT1**).
- **Mosaicismo:** La presencia de **líneas celulares genéticamente diferentes** puede explicar la discordancia entre genotipo y fenotipo.

Factores epigenéticos

- **Metilación diferencial:** Algunos genes de la determinación sexual están sometidos a regulación epigenética, lo que puede alterar su expresión sin mutación directa.

Factores hormonales y ambientales intrauterinos

- **Exposición a andrógenos exógenos** o disruptores endocrinos puede modificar el desarrollo genital incluso con genotipo normal.

8.4. Utilidad de la correlación genotipo-fenotipo

- Permite **estratificar el riesgo** de complicaciones (gonadoblastoma, infertilidad).
- Mejora la **planificación quirúrgica** al anticipar grados de masculinización o feminización.
- Contribuye a un **asesoramiento familiar más preciso**, ajustado a la situación concreta.

8.5. Limitaciones y retos

- La **expresión incompleta** de muchas mutaciones complica el diagnóstico prenatal y el asesoramiento anticipado.
- En ciertos DSD, el **fenotipo neonatal** no refleja necesariamente el fenotipo puberal o adulto (p.ej., déficit de 5 α -reductasa tipo 2).
- La **interpretación de variantes de significado incierto (VUS)** es uno de los principales retos del diagnóstico molecular actual.

¡Perfecto! Aquí tienes **20 referencias bibliográficas internacionales** actualizadas y relevantes para el **Tema 4: Aspectos genéticos y pruebas diagnósticas en DSD**, todas en **formato Vancouver**, y seleccionadas de libros, artículos y revisiones de alto impacto. Son útiles tanto para consulta de residentes como para especialistas que necesiten profundizar.

Autores: C. Tordable Ojeda, D. Cabezalí Barbancho

BIBLIOGRAFÍA:

1. Hughes IA, Houk C, Ahmed SF, Lee PA. Consensus statement on management of intersex disorders. **Pediatrics**. 2006;118(2):e488-500.
2. Ahmed SF, Achermann JC, Arlt W, Balen AH, Conway G, et al. Society for Endocrinology UK Guidance on the initial evaluation of a suspected difference or disorder of sex development (DSD). **Clin Endocrinol (Oxf)**. 2016;84(5):771-88.
3. Cools M, Nordenström A, Robeva R, Hall J, Westerveld P, Flück C, et al. Caring for individuals with a difference of sex development (DSD): a consensus statement. **Nat Rev Endocrinol**. 2018;14(7):415-29.
4. Lee PA, Nordenström A, Houk CP, Ahmed SF, Auchus R, Baratz A, et al. Global disorders of sex development update since 2006: perceptions, approach and care. **Horm Res Paediatr**. 2016;85(3):158-80.
5. Eggers S, Sadedin S, van den Bergen J, Robevska G, Hollink F, Forrest S, et al. Disorders of sex development: insights from targeted gene sequencing of a large international patient cohort. **Genome Biol**. 2016;17:243.
6. Mendonca BB, Domenice S, Arnhold IJ, Costa EM. 46,XY disorders of sex development (DSD). **Clin Endocrinol (Oxf)**. 2009;70(2):173-87.
7. Rey RA, Grinspon RP. Normal male sexual differentiation and aetiology of disorders of sex development. **Best Pract Res Clin Endocrinol Metab**. 2011;25(2):221-38.
8. Croft B, Sanders C, Davies L, Goodall J, Mazurkiewicz M, Fenech G, et al. Genetic diagnosis of endocrine disorders in the UK: investigation and findings in a large cohort of individuals with differences of sex development. **Genet Med**. 2021;23(7):1295-1303.

9. Achermann JC, Hughes IA. Disorders of sex development. In: Jameson JL, De Groot LJ, de Kretser D, et al, eds. **Endocrinology: Adult and Pediatric**. 7th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016. p. 2027-2053.
10. Baxter RM, Arboleda VA, Lee H, Barseghyan H, Adam MP, Fechner PY, et al. Exome sequencing for the diagnosis of 46,XY disorders of sex development. **J Clin Endocrinol Metab**. 2015;100(2):E333-44.
11. McElreavey K, Bashamboo A. Monogenic forms of disorders of sex development. **Best Pract Res Clin Endocrinol Metab**. 2018;32(4):355-366.
12. Arboleda VA, Sandberg DE, Vilain E. DSDs: genetics, underlying pathologies and psychosexual differentiation. **Nat Rev Endocrinol**. 2014;10(10):603-15.
13. Barbaro M, Cools M, Looijenga LH, Drop SL, Wedell A. Genetics of disorders of sex development. In: Fauser BC, editor. **Encyclopedia of Endocrine Diseases**. 2nd ed. Elsevier; 2018. p. 117-129.
14. Pappo AS, Armstrong GT. Genetics, genetic testing, and risk assessment in disorders of sex development and pediatric gonadal tumors. In: Pizzo PA, Poplack DG, editors. **Principles and Practice of Pediatric Oncology**. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016. p. 869-88.
15. Flück CE, Meyer-Böni M, Pandey AV, Kempná P, Miller WL, Schoenle EJ, et al. Why boys will be boys: two pathways of fetal testicular androgen biosynthesis are needed for male sexual differentiation. **Am J Hum Genet**. 2011;89(2):201-18.
16. Ostrer H. Disorders of sex development (DSDs): an update. **J Clin Endocrinol Metab**. 2014;99(5):1503-9.
17. Bashamboo A, McElreavey K. Human sex-determination and disorders of sex development (DSD). **Semin Cell Dev Biol**. 2015;45:77-83.
18. Balsamo A, Baldazzi L, Menabò S, Pirazzoli P, Cicognani A. Disorders of sex development: a genetic study of patients in a multidisciplinary clinic. **Endocr Connect**. 2013;2(2):69-77.
19. Croft B, Goodall J, Mazurkiewicz M, Sanders C, Davies L, Achermann JC. High diagnostic yield of NGS in individuals with DSD. **Endocrine Abstracts**. 2018;56:P1-30.
20. Kyriakou A, Dessens A, Bryce J, Iotova V, Juul A, Balsamo A, et al. Current models of care for disorders of sex development - results from an international survey of specialist centres. **Orphanet J Rare Dis**. 2016;11:155.